ご参考

「リピトール®」製品概要（日本）

【 製 品 名 】リピトール®錠5mg、リピトール®錠10mg（Lipitor®）

【 一 般 名 】アトルバスタチン・カルシウム水和物（atorvastatin calcium hydrate）

【 効能・効果 】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

【 用法・用量 】高コレステロール血症

通常、成人にはアトルバスタチンとして10mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は1日20mgまで
増量できる。

家族性高コレステロール血症

通常、成人にはアトルバスタチンとして10mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は1日40mgまで
増量できる。

【製 品 特 性 】①血清総コレステロール低下率30％、LDL-コレステロール低下率
41％、と優れた効果を示した。

②1日1回10mg投与により、治療目標値へ高い到達率を示す。

③糖尿病・高血圧症・心臓疾患などの合併症例でも、血清コレステロール値を良好
にコントロールできる。

④副作用は8.7％に認められた。

【規 格・包 装 】リピトール®錠5mg　100錠（PTP）、500錠（PTP、バラ）
1,000錠（PTP）

リピトール®錠10mg　100錠（PTP）、500錠（PTP、バラ）
700錠（PTP）、1,000錠（PTP）

【発　売　日 】2000年5月11日

【製 造 販 売 】アステラス製薬株式会社

【販 売 提 携 】ファイザー株式会社