

<エスタックイブファイン、製品概要>

1. 成分：9錠（1日量）中

イブプロフェン・・・・・・・・・・450mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・ 7.5mg
アンブロキシール塩酸塩・・・・・・・・ 45mg	無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・ 75mg
ヨウ化イソプロパミド・・・・・・・・・・ 6mg	アスコルビン酸（ビタミンC）・・・・・・ 300mg
ジヒドロコデインリン酸塩・・・・・・・・ 24mg	チアミン硝化物（ビタミンB ₁ 硝酸塩）・・・ 24mg
dℓ - メチルエフェドリン塩酸塩・・・ 60mg	

2. 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	大人（15才以上）	15才未満
1回量	3錠	服用しないこと

3. 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



<参考>

当社独自の製剤技術、PCM と MCT を応用

OTC 医薬品の総合感冒薬は、多くの症状に対応するため多岐に渡る成分を配合しており、それ故、薬物放出性や崩壊速度等のコントロール、相互変化及び経時安定性など、OTC 医薬品ならではの難しい問題があります。

当社では、PCM(Particle-size Control Method、特許出願中)や MCT(Multi Components Tablet)技術などを駆使して、錠剤の小型化、安定化、優れた有効性を実現しております。

アンブロキシール塩酸塩の働き

1. 肺サーファクタント（肺表面活性物質）分泌促進作用

たんと気道粘膜の潤滑油の役目を担う肺サーファクタントの分泌を増加させ、たんの排出をスムーズにします。

2. 気道液分泌促進作用

気道液の分泌を促進することで粘液の粘度を下げ、たんが排出されやすい状態にします。

3. 線毛運動亢進作用

たんを物理的に排出する役目を担う線毛の活動を活発化し、たんの排出を促します。